

元培科技大學

100 學年度第二學期

日間部暨進修部轉學考入學考試

綜合護理學 試題

共 2 頁

准考證號碼

注意事項 試題卷右上角填上准考證號碼，請依題號順序在「答案卷」作答，考完後請將「試題」及「答案卷」一併繳回。

選擇題 (每題 2.5 分)

- 黃先生自主能力良好，在臨床上照顧上，醫護人員主動提供與診斷有關的資訊給病人，這是符合護理倫理中的何種原則？
(A)誠實原則 (B)自主原則 (C)公平原則 (D)施益原則。
- 有關住院老人的環境考量下列何者為非？(A)將床搖低 (B)拉上床欄 (C)室內溫度比一般高 (D)不論何時，室內光線要暗，以利休息。
- 在建立專業性護病關係時，下列何者不恰當？(A)當病人的健康信念與護理人員不相同時，應立即給予批評與糾正 (B)護理人員應在能協助病人的情況下適當的表露自己 (C)護理人員應為關係的建立與進展負責 (D)護理人員與病人共同訂定朝向健康的特定目標。
- 護理人員當遇到病人醫囑單上的醫囑不夠清楚時，最適當的處理方式是：(A)與其他護理同仁討論 (B)問病房的值班醫師 (C)請教護理長 (D)找到簽醫囑的醫師問清楚。
- 在照顧愛滋病患時，我們應使用哪一種隔離防護措施？(A)一般標準防護措施 (B)空氣傳染防護措施 (C)接觸傳染防護措施 (D)飛沫傳染防護措施。
- 下列何者為客觀資料：(A)看護說：阿嬤的血壓好像高起來了 (B)護理人員說：病人冒冷汗、臉色蒼白 (C)病人說：我整夜都睡不好 (D)家屬說：他都吃不下，只吃兩口稀飯。
- 王老先生跌倒導致左手臂與左腳骨折都打上石膏。護理人員要如何協助王老先生更換衣服 1.先脫右側 2.先脫左側 3.先穿右側 4.先穿左側 (A) 1.3. (B) 1.4. (C) 2.3. (D) 2.4。
- 下列何者運動屬於等長運動 (A)會陰肌肉收縮「凱格爾氏運動: Kegel's exercise」(B)伏地挺身 (C)走路 (D)游泳。
- 為了讓住院的病患能有良好的睡眠所做的措施，下列何者的助益最少？(A)鼓勵並安排訪客盡量在白天探訪 (B)減少因醫療工作車所造成的噪音:如保養車輪 (C)將一天的靜脈輸液與飲水量平均分配在 24 小時 (D)夜間給藥換藥同時測量生命徵象。
- 下列何種情形會造成血壓下降？(A)活動時 (B)焦慮疼痛時 (C)飲酒時 (D)肥胖者。
- 測量血壓時，下列何種情形會造成「數值假性偏高」？(A)病人手臂高於心臟 (B)壓脈帶綁太緊 (C)壓脈帶大小太窄 (D)視線高於水銀柱(往下看)。
- 下列何種症狀禁忌用熱？(A)循環功能障礙者:如糖尿病 (B)腳踝扭傷後 72 小時 (C)風濕性關節炎之關節疼痛 (D)因姿勢不良造成的腰痠背痛。
- 有關鼻胃管灌食前，反抽胃內容物的敘述下列何者不正確？(A)若反抽出來是胃液，則將胃液推回胃中，再開始灌食 (B)灌食時盡量讓病人平躺或左側臥 (C)灌食時，必須避免讓空氣進入，防腹脹發生 (D)需要注意管灌飲食與器具的清潔維護。
- 陳先生因明天要做腸道檢查，依醫囑將採「清流質飲食」，下列哪些食物是可以食用的 1.稀飯 2.去油清湯 3.牛奶 4.米湯 (A) 1.2. (B) 2.4. (C) 1.3. (D) 3.4。
- 下列何者藥物注射後，必須按摩注射部位以促進藥物吸收？(A)止痛劑 (B)胰島素 (C)鐵劑 (D)結核菌素試驗。
- 有關給藥時下列何者不恰當？(A)服用油類藥物可配合果汁，以去除味道 (B)服用鐵劑時，應用吸管以防牙齒著色 (C)為加速藥效作用，鎮靜劑可與牛奶一起服用 (D)危急時刻護生能接受口頭醫囑。
- 李小姐長期嘔吐，可能會造成何種現象？(A)血鈉過高 (B)代謝性酸中毒 (C)血鉀過高 (D)代謝性鹼中毒。
- 在幫病人靜脈注射時發現有小血塊阻塞情形，導致輸液不通，此時應如何處置？(A)拔除穿刺針，更換注射部位 (B)用原子筆捲導管，沖散阻塞物 (C)稀釋 Heparin，於接頭處注射，溶解小血塊 (D)提高輸液評的高度，增加壓力。
- 哪些情形會使病人的大便成為灰白色 1.下腸胃到攝影後 2.胃潰瘍出血 3.膽道阻塞 4.腸道感染(A)1.2 (B)2.3. (C)1.3. (D)3.4。
- 下列何者不是灌腸的禁忌症(A)安胎者 (B)腦壓高者 (C)肝性昏迷患者 (D)直腸狹窄者。
- 解尿後上留存於膀胱內的餘尿量，正常應少於多少 c.c.(A)50 c.c. (B)100 c.c. (C)150 c.c. (D)200 c.c。
- 林小弟騎車摔倒，悉蓋與手肘嚴重擦傷，傷口先以紗布覆蓋後，接下來要用何種包紮法包紮？(A)螺旋迴返形包紮法 (B)8 字型包紮法 (C)環型包紮法 (D)人字型包紮法。

元培科技大學

100 學年度第二學期

日間部暨進修部轉學考入學考試

綜合護理學 試題

共 2 頁

准考證號碼

注意事項 試題卷右上角填上准考證號碼，請依題號順序在「答案卷」作答，考完後請將「試題」及「答案卷」一併繳回。

23. 有關臨終病人的護理措施，下列何者不洽當？(A)對於意識清醒的個案，可提供軟質或流質飲食 (B)個案使用止痛劑，須考量藥物所造成的成癮作用 (C)此階段的護理的主要目標為：提供舒適 (D)在靈性的需求層面，可提供個案宗教信仰的支持。
24. 蔡先生因車禍 經急診入院，現入住病房主訴有頭痛與嘔吐的現象，你是他的主護護理師，首要的入院護理為(A)收集健康史 (B)測量身高體重 (C)測量生病徵象，並通知醫師處理 (D)環境介紹。
25. 宋女士 56 歲，因子宮頸癌入院治療，當護理人員初次與她互動時，宋女士提出許多的要求，並對護理人員給予的環境介紹，抱怨草率、不清楚，且顯得生氣，此時宋女士處於專業人際關係發展的哪一期？(A)互動前期 (B)認識期 (C)工作期 (D)結束期。
26. 在哪一個理念的引導下，護理專業發展出以人為中心的整體性護理模式？(A)實用主義 (B)浪漫主義 (C)存在主義 (D)苦行僧主義。
27. 王老先生的家人要求醫護人員對病人隱瞞其罹患癌症的實情，因此其所需要的化學治療及放射線治療也暫時無法進行，若醫護人員依家屬的要求來做，可能違反的倫理原則何者除外？(A)自主原則 (B)公平原則 (C)不傷害原則 (D)誠實原則。
28. 病人向護理人員說「你可不可以給我建議，我是不是應該開刀？」，護理人員回答「你認為呢？」，這樣的溝通方式你認為：(A)不適當，沒有回答病人的關心 (B)不適當，會使病人產生不信任感 (C)適當，可使病人正視自己的想法 (D)適當，表示護理人員接納病人的任何想法。
29. 在護理人員-病人的專業性人際關係建立的過程中，何護理行為不適合於介紹期中執行？(A)說明環境及設備使用方式 (B)對病人的試探性行為採取接納的態度 (C)鼓勵病人表達其感受及不舒適 (D)請病人參與護理目標的擬訂。
30. 王老太太 81 歲，BMI 17，因中風左側偏癱，意識清楚，大小便可控制自如，此次因感染流感發燒住院，你認為為預防此病人可能會有的健康問題，下列護理措施的優先順序何者是排在較後面的？(A)聽診呼吸音及觀察氧合的徵象 (B)鼓勵做床上的關節運動及健肢的加阻力運動 (C)飲食補充鈣質以免骨鈣流失 (D)每班觀察皮膚的完整性。
31. 關於脈搏短絀 (pulse deficit) 的敘述下列何者正確？(A)致病機轉是主動脈閉鎖不全 (B)是指心尖脈次數少於橈動脈 (C)通常吸氣時正常呼氣時症狀出現 (D)常發生於心房纖維顫動的病人。
32. 有關測量血壓的敘述，下列何者不正確？(A)首次應測量雙手，以較低的那側數值為主 (B)每次測量都應測同一部為同一姿勢為佳 (C)測量時病人講話可能會導致血壓升高 10% ~40% (D)壓脈帶放氣速度太慢會造成假性偏高。
33. 輸血時出現非溶血性熱原反應及處理，下列何者不正確？(A)發生時先停止輸血 (B)與抗原抗體反應有關 (C)主要發生於以前接受過輸血的病人 (D)處理後若體溫可恢復正常則可繼續輸血。
34. 靜脈輸液的過程中，病人出現脈搏快而弱、呼吸困難、水腫，護理人員的護理措施何者最正確？(A)立即拔除靜脈導管 (B)給予病人左側臥 (C)依照醫囑給予利尿劑 (D)以上皆正確。
35. 關於輸血的敘述，下列何者不正確？(A)輸血的前 15 分鐘速度為 40-60 gtt/min (B)每單位血製品需在 4 小時內輸完 (C)加溫器的溫度不可超過 38°C (D)輸血加壓帶的壓力不可超過 300 mmHg。
36. 對使用導尿管的病人實施膀胱訓練的敘述下列何者正確？(A)為避免膀胱脹，應減少水分的攝取 (B)應每隔 4 小時放開管夾一次 (C)睡眠時亦應繼續訓練 (D)使用利尿劑的病人不宜夾管以免膀胱過脹。
37. 關於 Penicillin test (PCT) 的敘述，下列何者正確？(A)即使病歷記載病人有 penicillin 過敏的經驗，仍然要實施 PCT 做確認 (B)注射藥物單位為 0.1 c.c. (C) 注入藥物前需反抽針心 (D)注射時需同時準備 Epinephrine 至病人單位。
38. 陳先生因膽囊切除術後傷口疼痛，護理人員依醫囑給予 Demerol 1Amp IM st.，下列措施何者不適當？(A)注射陳先生的腹臀區是最安全的部位 (B)注射角度應採 90° (C)選擇 21-25 G 的針頭較適合 (D)告訴陳先生注射後不需按摩以使藥物緩慢吸收。
39. 在精密輸液套內加 Cefazolin 500 mg 後溶液量為 30cc，預計 15 分鐘滴注完畢，則正確的滴速為？(A) 30 gtt/min (B) 60 gtt/min (C) 90 gtt/min (D) 120 gtt/min。
40. 為女病人執行單次導尿技術時，下列何者正確？(A)戴上無菌手套後將導尿包內層包布置於病人臀下 (B)第一顆優碘棉球消毒尿道口 (C)導尿管應深入約 3 - 5 公分 (D)導尿量若超過 500 ml 可能導致休克的危險。

元培科技大學

100 學年度第 2 學期日間部暨進修部轉學入學考試

三年級 綜合護理學 試題標準答案紙

題號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
解答	B	D	A	D	A	B	B	A	C	C
題號	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
解答	C	A	B	B	A	D	D	A	C	C
題號	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
解答	A	B	B	C	B	C	B	C	D	C
題號	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
解答	D	A	D	C	A	D	D	D	D	D