

元培科學技術學院

九十三年年度第日間部、進修部

二年制轉學入學考試

護理系

基本護理學試題

准考證號碼

注意事項 請先在試題卷首准考證號碼之方格內填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡」、「試題」一併繳回。

每題 2.5 分

01. 林先生鉀離子濃度 2.8 meq/dl，他可能會有下列何症狀？(A)心律不整 (B)水腫 (C) Chvotek's sign 陽性 (D)腹瀉
02. 許先生因車禍骨折要開刀，你發現他顯得坐立不安、注意力無法集中且暴躁，你應針對下列何問題進一步評估？(A)不遵從 (B)低自尊 (C)憂鬱 (D)焦慮
03. 評估個案的自我概念時，下列何種方式較不宜？(A)稱呼個案的名字來表示對他的認同 (B)善用眼對眼的接觸觀察其非語言的反應 (C)了解其過去被照顧的經驗是很重要的 (D)只有對外國人才需要評估文化相關因素
04. 林先生行胃切術後裝置鼻胃管，六天後才拔除，插鼻胃管的目的是為何？(A)灌洗 (B)灌食 (C)減壓 (D)加壓
05. 下列何者是對收集護理史目的的最佳描述？(A)是護理評估的一部分 (B)可提供護理人員規劃護理計畫的重要資料 (C)提供個案現存性健康問題的訊息 (D)是與個案的一種非正式的溝通
06. 請選出正確的護理診斷書寫方式：(A)呼吸道功能失效相關於肺炎以呼吸音呈粗爆裂音來呈現 (B)知識缺失：相關於不正確的用藥知識 (C)潛在危險性傷害與對危險缺乏警覺有關 (D)潛在危險性傷害相關於無家屬陪伴
07. 救護車送來一位路倒的男性遊民，呼吸喘劇烈咳嗽有濃痰，主訴最近三個月瘦非常多，且有酗酒的習慣，第一線護理人員的處置何者正確？(A)將病人安排住負壓隔離病房 (B)護理個案時戴上外科口罩 (C)個案離開病房去做檢查時戴上外科口罩 (D)以上皆正確
08. 下列情況何者使老人的排便型態改變？(A)腸蠕動增加 (B)咀嚼能力降低 (C)較易吃到高纖的食物 (D)胃與食道的排空較快
09. 因身體活動障礙無法如廁而解尿在床上，稱為(A)完全性尿失禁 (B)功能性尿失禁 (C)壓力性尿失禁 (D)急迫性尿失禁
10. 明天預行大腸鏡檢查的病人，今天開始進食清流質飲食，下列哪些食物的選擇是正確的？(A)牛奶、過濾果汁、豆漿 (B)運動飲料、蜂蜜水、米湯 (C)豆漿、去油肉湯、過濾果汁 (D)稀飯、優酪乳、米湯
11. 有關加阻力運動訓練的注意事項，正確者為：(A)需在個案可主動運動前即開始訓練 (B)由個案的健側為患側施加阻力 (C)阻力應施加於遠端關節 (D)在活動的末期阻力最高
12. 下列哪一句問句方式可使護理人員獲得較多資料？(A)你吃的好不好？ (B)你沒有抽煙的習慣吧？ (C)你可不可以說出哪裡不舒服？ (D)你認為這次生病的原因是.....
13. 一位 76 歲的老病人，因為疼痛接受了麻醉性止痛劑，護理人員首要注意安全問題是：(A)跌倒 (B)不動的合併症 (C)異物吸入 (D)廢用症候群
14. 下列何種血品可補充凝血因子(A)全血 (whole blood) (B)濃厚紅血球 (Pack RBC) (C)新鮮冷凍血漿 (FFP) (D)血小板濃厚液 (Platelet)
15. 某接受鼻胃管灌食的病人，近來發生腹瀉的情形，護理人員需考慮的原因下列何者不包括？(A)配方濃度過稀 (B)微生物感染 (C)是否口服抗生素治療中 (D)灌食速度過快
16. 鼓勵雙側肺炎的病人臥床休息最主要的目的為：(A)使病人的睡眠不受干擾 (B)降低身體對氧氣的消耗 (C)減少止痛藥物的需要量 (D)預防病人因步態不穩而跌倒
17. 下列何者屬於等張溶液且其組成與血漿電解質組成相同？(A)生理食鹽水 (B)林格式液 (C)乳酸林格式液 (D)台大五號

背面有試題

18. 下列何者不是可滿足個案自尊及自我概念的護理措施？(A)優先滿足個案的生理需求 (B)鼓勵個案保有其日常生活之常規 (C)向個案保證只要他有需要你一定會在 (D)尊重個案的想法，讓他覺得他是被接受的
19. 收集糖尿病患的尿液作尿糖檢查的正確方法為：(A)收集早晨的第一次尿液 (B)收集睡前的最後一次尿液 (C)收集飯後的尿液 (D)收集早晨排空膀胱後 30 分鐘的尿液
20. 個案於 8 小時前移除導尿管後尚未解尿，下列合護理措施是你現在立即需採取的？ (A)通知醫師建議給予單次導尿 (B)執行克迪式操作法 (Crede maneuver) (C)給予聽流水升或會陰沖洗 (D)於恥骨聯合上方執行觸診
21. 病人接受靜脈注射的過程當中，在護士更換注射套管後突然發生血壓下降，脈搏變快，在第一時間護士應採取的措施是：(A)停止注射 (B)更換管路 (C)加快靜脈注射流速 (D)使病人採側臥並搖低床頭、檢查導管
22. 未緩解的疼痛所造成的生理反應何者不包括？ (A)代謝率下降 (B)腸胃活動減慢 (C)心跳與血壓上升 (D)身體水份滯留
23. 下列關於不動所造成的合併症之敘述，何者不正確？ (A)椎骨的鈣磷流失是最迅速的 (B)表皮受壓超過 32 mmHg 將導致壓瘡的產生 (C)使血液黏稠度降低，血液回流加速 (D)心跳速度及血壓會代償性的增加
24. 脊髓損傷部位位於 T8，則可能造成何種排尿障礙？(A)迫尿肌反射消失 (B)膀胱無張力(C)反射性排尿消失 (D)經常自發性膀胱痙攣
25. 下列何者不是造成低血鉀的導因？ (A)燒傷 (B)留鹽激素過多 (C)鼻胃管抽吸 (D)腹瀉
26. 關於年老病人的照顧，下列何者適當？ (A)有引流管的病人應避免下床以維護其安全 (B)當老人常常重複敘述過往的事件時應打斷他，使其有現實感 (C)當老人抱怨兩三天才解一次便時，應告知這是正常老化的結果(D)以上皆是
27. 病人由靜脈注射補充溶液，1000cc 八小時注射完畢，使用微滴套管，速度應如何調整？(A) 42 gtt/min(B) 84 gtt/min(C) 105 gtt/min(D) 125gtt/min
28. 協助一位因腹部手術而臥床五日的個案初次下床，關於安全的護理診斷下列何者最佳？(A)急性疼痛 (B)皮膚完整性受損 (C)組織灌流改變 (D)潛在性活動無耐力
29. 下列處於制動的個案何者是最危險的？(A)股骨骨折的三歲幼兒 (B)行甲狀腺切除術的 48 歲女性 (C)髌骨骨折牽引中的 78 歲男性 (D)行子宮切除術的 38 歲女性
30. 護士甲為病人進行大量灌腸，當已灌入 200c.c 生理鹽水時，病人感到無法忍受，想起床立即去解便，此時護士甲最適當的處置為：(A)讓病人到廁所去解便，解完後再灌注一次(B)請病人忍耐不要解出來，同時繼續緩慢灌注(C)告訴病人這是正常感覺，不必理會，繼續灌注 (D)暫時停止灌注，讓病人休息，等症狀消失後再灌注
31. 有關排尿之機轉，下列敘述何者錯誤？(A)副交感神經受刺激，引起膀胱逼尿肌收縮(B)交感神經受到刺激引起尿道內括約肌鬆弛 (C)大腦皮質意志性使尿道外括約肌鬆弛 (D)薦神經之衝動刺激膀胱逼尿肌收縮
32. 下列不適宜於泌尿道感染病人之措施為： (A)鼓勵其白天至少每 2 小時排尿一次，夜晚 1~2 次，以免膀胱膨脹 (B)建議多飲用檸檬汁、柳橙汁等柑橘類果汁 (C)鼓勵攝取小紅梅果汁來降低尿液 PH 值 (D)建議病人在性活動前後應解尿
33. 下列何者清洗灌腸之合宜壓力？ (A)灌腸筒底至肛門垂直距離約 6~8 寸 (B)灌腸筒液面高度至肛門處置距離約 18~24 寸 (C)灌腸筒底至肛門垂直距離 10~14 寸 (D)灌腸筒液面高度至肛門垂直距離約 24~28 寸
34. 下列各項使用拐杖行走的步態中，何者適用於單側肢體無法負重時？(A)四點式 (B)三點式 (C)二點式 (D)搖擺式
35. 下列何者不是發生在睡眠的非快速動眼期第四期？ (A)生動的夢 (B)夜尿及夢遺 (C)身體完全鬆弛不能動 (D)腦下垂體前夜分泌生長素
36. 下列有關電解質的分佈，何者正確？(A)細胞內主要的陽離子為鉀離子 (B)細胞內主要的陽離子為鈉離子 (C)細胞內主要的陰離子為氯離子 (D)細胞內主要的陽離子為重碳酸離子
37. 下列哪些病人或情況容易發生代謝性酸中毒的問題？1.嚴重嘔吐患者 2.長期腹瀉者 3.慢性腎衰竭患者 4.呼吸道阻塞患者 (A) 12 (B)23 (C) 14 (D) 234
38. 血鈣過少的病人，最常出現的症狀為下列何者？(A)嗜睡 (B)四肢麻木、手指刺痛 (C)骨質疏鬆 (D)厭食
39. 當病患脫水現象時，會出現下列哪些實驗室檢查數據？ (A)血比容(Hct.)增加、尿比重增加、血液尿素氮(BUN)增加、肌酸酐(Creatinine)正常 (B)血比容(Hct.)增加、尿比重下降、血液尿素氮(BUN)增加、肌酸酐(Creatinine)增加 (C)血比容(Hct.)減少、尿比重增加、血液尿素氮(BUN)減少、肌酸酐(Creatinine)正常(D)血比容(Hct.)增加、尿比重下降、血液尿素氮(BUN)增加、肌酸酐(Creatinine)增加
40. 水分經由何種方式進出細胞膜？(A)擴散 (B)滲透 (C)主動運輸 (D)促進運輸